

# COVID-19 Pruebas

Para ver este documento en idiomas diferentes o en formato web visite [ph.lacounty.gov/covidpruebas](http://ph.lacounty.gov/covidpruebas)

## PRUEBAS BÁSICAS DE CORONAVIRUS



Este video de 3 minutos en [inglés](#) y [español](#) explica los conceptos básicos de la prueba del COVID-19.

NOTA: La información de esta página web no reemplaza la guianza médica. Hable con su proveedor de atención médica sobre si necesita hacerse una prueba y, si se hace la prueba, qué significa su resultado.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS DE COVID-19

- Existen muchas pruebas diferentes para el COVID-19, algunas que buscan una infección actual y otras que buscan una infección pasada.
- Es importante hacerse una prueba de infección actual si tiene síntomas de COVID-19, incluso si está [completamente vacunado](#). A veces, se recomienda hacerse pruebas para detectar la infección actual incluso si no tiene síntomas. Consulte [Pruebas de infección actual por COVID-19](#) para obtener más información.
- Las pruebas por sí solas no detendrán la propagación de COVID-19. La mejor manera de reducir su riesgo de contraer el COVID-19 es vacunarse contra el COVID-19 y continuar [practicando la prevención diaria](#). Esto incluye mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca y quedarse en casa cuando esté enfermo. Además, evite las multitudes y los espacios interiores con poca circulación de aire.

## TIPOS DE PRUEBA DE COVID-19

Hay pruebas de COVID-19 disponibles que pueden buscar una infección actual o una infección pasada.

- Una prueba viral puede mostrar si tiene una infección actual. Hay dos tipos de pruebas virales: pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés) y pruebas de antígenos. Estas son pruebas de hisopo o saliva. Nunca son análisis de sangre.
- Una [prueba de anticuerpos](#) (también conocida como prueba serológica) puede indicarle si tuvo una infección anterior. Las pruebas de anticuerpos no deben usarse para diagnosticar una infección actual. Tampoco se pueden usar para saber si actualmente está protegido contra el COVID-19. Estos son análisis de sangre.

	PRUEBAS VIRALES (pruebas de hisopo o saliva) Busca infección actual		PRUEBA ANTICUERPO (análisis de sangre) Busca infecciones pasadas
	PRUEBA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO (NAAT, por sus siglas en inglés)	PRUEBA DE ANTÍGENO	PRUEBA ANTICUERPO
	También conocidas como pruebas moleculares. Incluye diferentes tipos de pruebas como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCR, por sus siglas en inglés (como la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa - RT-PCR)</li> <li>• Amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP)</li> </ul>		También conocido como análisis de sangre, prueba serológica o "serología"
<b>Cómo funciona la prueba</b>	Detecta material genético (ARN) <b>dentro</b> del virus COVID-19	Detecta proteínas (o antígenos) <b>en la superficie</b> del virus COVID-19	Detecta anticuerpos producidos por el sistema inmunológico
<b>Como se hace la prueba</b>	Saliva o frotis de la nariz o la garganta	Frotis de la nariz o la garganta	Sangre de un pinchazo en el brazo o el dedo
<b>Cuánto tiempo se tarda en obtener resultados</b>	El mismo día y hasta 3 días. Algunos son rápidos (alrededor de 20 minutos)	La mayoría son rápidos, alrededor de 15 minutos o menos	El mismo día y hasta 3 días

**PRUEBAS DE INFECCIÓN ACTUAL POR COVID-19**

Hay 2 tipos de pruebas virales (hisopos o saliva) que se usan para detectar la infección actual por COVID-19: NAAT y antígeno. Ambos tipos de prueba se pueden usar para pruebas de diagnóstico y pruebas de detección (consulte a continuación). Las pruebas de PCR son las mejores pruebas para buscar una infección actual; son un tipo de prueba de NAAT que generalmente se realiza en un laboratorio.

- Los análisis de anticuerpos (sangre) no deben usarse para buscar una infección actual.
- Asegúrese de saber qué tipo de prueba le van a hacer.

**Pruebas de diagnóstico**

Las pruebas de diagnóstico se usan cuando hay motivos para creer que la persona tiene el COVID-19 porque tiene síntomas y/o sabe que estuvo expuesto. El propósito de la prueba es averiguar si actualmente está infectado con el virus que causa el COVID-19.

It is recommended if:

- **Tiene síntomas de COVID-19:** hable con un médico y hágase la prueba, incluso si está completamente vacunado o ha tenido el COVID-19 en el pasado.
- **Ha sido un "contacto cercano" con alguien que tiene el COVID-19** en los últimos 14 días\*: (Incluso si su prueba es negativa, aún deberá completar su cuarentena.)

\* Si está completamente vacunado o ha tenido una prueba viral (hisopo o saliva) positiva para el COVID-19 en los últimos 90 días, no necesita hacerse la prueba siempre y cuando no tenga síntomas de COVID-19.



- **Forma parte de una investigación de un brote:** Si vive o trabaja en un lugar donde a otras personas se les ha diagnosticado COVID-19, es posible que deba hacerse la prueba, incluso si está completamente vacunado o tuvo COVID-19 en el pasado.

**Nota:** Tanto las pruebas de NAAT como las de antígenos se pueden usar para las pruebas de diagnóstico, pero las pruebas de antígeno tienen más probabilidades que las NAAT de dar un resultado [falso negativo](#) (lo que significa que el resultado de la prueba es negativo, pero en realidad tiene la infección).

- Si tiene síntomas de COVID-19 y obtiene una prueba de antígeno con un resultado negativo, debe hacerse una prueba de PCR (el mejor tipo de prueba NAAT) para ver si tiene el COVID-19 o no. Consulte [Comprender el resultado de su prueba viral y qué hacer después](#) para obtener más información.

### Pruebas de detección

Las pruebas de detección se usan cuando alguien no tiene ningún síntoma de COVID-19 y no ha estado cerca de alguien con el COVID-19, pero aún desea saber si podría estar infectado con el virus que causa el COVID-19.

Excepto donde se lista a continuación, las pruebas de detección no se recomiendan para personas completamente vacunadas o para personas que tuvieron una prueba viral (hisopo o saliva) positiva en los últimos 90 días.

*No se recomiendan las pruebas de detección*

*\* si:*

- Está [completamente vacunado](#) o
- Ha tenido el COVID-19 detectado con una prueba viral (hisopo o saliva) positiva en los últimos 90 días.

*\*Excepto donde se lista a continuación*

*Actualmente, Salud Pública exige pruebas de detección si \*:*

- Vive o trabaja en un asilo de ancianos (incluso si está completamente vacunado)
- No está completamente vacunado y trabaja o juega en ciertos sitios donde no siempre se puede seguir el distanciamiento y el usar mascarilla de forma segura.
- Viaja en avión a los Estados Unidos desde otro país (incluso si está completamente vacunado). [La prueba no es necesaria si tiene prueba de recuperación de una prueba viral (hisopo o saliva) positiva en los últimos 90 días].

\* Algunas organizaciones o establecimientos también pueden requerir pruebas de detección.

*Actualmente se recomiendan las pruebas de detección:*

- Si NO está COMPLETAMENTE VACUNADO y
  - Vive o trabaja en un sitio de alto riesgo (como un refugio, centros correccionales y de detención, hogares grupales o un centro de atención comunitaria)
  - Es parte de un programa de evaluación en el lugar de trabajo o en la escuela
  - Está practicando deportes de contacto alto o contacto moderado
  - Viaja fuera de California (dentro de los Estados Unidos). Se recomienda hacerse pruebas antes y después del viaje. Consulte el [Aviso de Viaje](#).
- Después de regresar de un viaje internacional (incluso si está completamente vacunado)

**Nota:** Tanto las pruebas de NAAT como las de antígenos se pueden usar para las pruebas de detección. Las pruebas de antígenos se usan a menudo porque son más baratas y dan resultados rápidos. Pero cuando se usan como prueba de detección, es más probable que den un resultado [falso positivo](#) (lo que significa que el resultado de la prueba es positivo, pero en realidad no tiene la infección).

## COVID-19 Pruebas

---

- Si tiene una prueba de detección de antígenos positiva, se recomienda que se haga una prueba NAAT después para verificar que el resultado sea correcto. Debe aislar mientras espera el resultado de NAAT. Consulte [Comprender el Resultado de su Prueba Viral y qué hacer Después](#) para obtener más información.

### Dónde hacerse una prueba

- Con su médico. Si necesita ayuda para encontrar un médico, llame al 2-1-1 o visite [211LA](#).
- En un sitio de pruebas del condado de Los Ángeles: estos sitios ofrecen pruebas de COVID-19 gratuitas a las personas que viven en el condado de Los Ángeles, sin importar su estado migratorio. Hay sitios de pruebas disponibles donde no necesita bajarse del vehículo o donde se llega caminando y no siempre se necesitan citas. Visite [lacounty.gov/testing](#) o llame al 2-1-1 para obtener más información.
- En una farmacia. Llame o visite el sitio web de su farmacia local para averiguar si ofrecen pruebas de COVID-19.
- En casa. Los kits y las pruebas de recolección para hacerse en casa están disponibles con receta médica o sin receta en una farmacia o tienda. Visite el sitio web de [prueba en casa](#) de los CDC para obtener más información.

Tenga cuidado con las estafas de pruebas de COVID-19: visite nuestra página de [estafas y fraudes de COVID-19](#) para obtener más información.

### Pagando por una prueba

- Las aseguradoras de salud están obligadas (por ley federal) a cubrir el costo total de las pruebas de diagnóstico del virus, tenga o no síntomas. Un médico deberá ordenar la prueba. (Tenga en cuenta que, si compra una prueba para hacerse en casa sin receta, es probable que su seguro médico no la pague).
- La prueba a través de los sitios de prueba móviles del condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles es gratuita para todas las personas que viven en el condado de Los Ángeles que cumplen con los requisitos para la prueba, sin importar su estado migratorio.

### Qué debe saber al hacerse la prueba

- Hable con su médico sobre qué prueba es adecuada para usted.
- Si tiene que hacerse la prueba con propósito de detección, como por motivos de trabajo o de viaje, asegúrese de obtener una prueba que cumpla con los requisitos de su empleador, aerolínea u otra institución.
- Antes de hacerse una prueba, asegúrese de saber:
  - Qué tipo de prueba se le ofrece (NAAT o antígeno).
  - Cuánto tiempo tomará obtener sus resultados.
  - Cómo se dara cuenta de los resultados.
  - Qué precauciones debe tomar mientras espera sus resultados y qué debe hacer si su resultado es positivo o negativo.
- Después de recibir el resultado de su prueba, asegúrese de comprender lo que significa su resultado y qué hacer después. Se le debe entregar una hoja informativa sobre el examen que recibió. Si no lo hizo, pida uno.

**Comprensión de los resultados de sus pruebas virales y qué hacer después**

Hable con su médico para asegurarse de comprender lo que significa el resultado de su prueba viral y que hacer después.

RESUMEN: PRUEBAS VIRALES: QUÉ SIGNIFICA UN RESULTADO		
	PRUEBA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO (NAAT, por sus siglas en inglés)	PRUEBA DE ANTÍGENO
<b>Resultado positivo*</b>	Un resultado <b>positivo</b> significa que la prueba encontró el virus COVID-19. Es muy probable que tenga el COVID-19.  Debe seguir las <a href="#">instrucciones de aislamiento</a> .	Un resultado <b>positivo</b> significa que la prueba encontró las proteínas del virus COVID-19. Es muy probable que tenga el COVID-19.  Debe seguir las <a href="#">instrucciones de aislamiento</a> .
<b>Resultado negativo*</b>	Un resultado <b>negativo</b> significa que no se encontró el virus que causa el COVID-19.  <b>Si es un <a href="#">contacto cercano</a></b> , debe permanecer en <a href="#">cuarentena</a> durante todo el tiempo porque aún puede estar infectado, pero era demasiado pronto para que su prueba fuera positiva.	Un resultado <b>negativo</b> significa que no se encontraron proteínas del virus COVID-19.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Si tiene síntomas de COVID-19, se recomienda que ahora se haga una prueba NAAT (PCR) porque las pruebas de antígenos frecuentemente no detectan las infecciones. <a href="#">Quédese en casa</a> hasta que su prueba de PCR esté lista.</li> </ul> <b>Si es un <a href="#">contacto cercano</a></b> , debe permanecer en <a href="#">cuarentena</a> durante todo el tiempo porque aún puede estar infectado, pero era demasiado pronto para que su prueba fuera positiva.

\* Ninguna prueba para el COVID-19 es perfecta. Cualquier prueba puede producir:

- Resultados falsos negativos
  - Esto significa que el resultado de la prueba debe ser positivo porque SÍ tiene el COVID-19, pero en vez es negativo.
  - Esto puede pasar, por ejemplo, si la muestra no se recogió correctamente, la prueba se tomó demasiado pronto o la prueba no funcionó bien.
- Resultados falsos positivos
  - Esto significa que el resultado de la prueba debe ser negativo porque NO TIENE EL COVID-19, pero en vez el resultado es positivo.
  - Esto puede pasar, por ejemplo, si es muy poco probable que la persona examinada esté infectada y la prueba no haya funcionado bien.

**Su prueba de COVID-19 fue POSITIVA**

La prueba detectó el virus de COVID-19. Es muy probable que tenga el COVID-19 y pueda contagiar a otras personas.

**Si tiene síntomas de COVID-19**

- **[Aíslese](#), quédese en casa lejos de los demás hasta que:**
  - Han pasado al menos 10 días desde que tuvo los primeros síntomas **y**
  - No ha tenido fiebre durante 24 horas (sin medicación) **y**
  - Sus síntomas han mejorado.



## COVID-19 Pruebas

- **Dígales a todos sus [contactos cercanos](#) que han estado expuestos:** Deles las instrucciones de cuarentena disponibles en [ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish/](https://ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish/)
- **Siga las instrucciones de aislamiento completas:** [ph.lacounty.gov/covidisolationSpanish/](https://ph.lacounty.gov/covidisolationSpanish/)
- **Responda la llamada de LA Public Health:** ayude a reducir la propagación del COVID-19 respondiendo si recibe una llamada de "LA Public Health" o (833) 641-0305. También puede llamar al (833) 540-0473.

### Si no tiene síntomas

- **[Aíslese](#):** permanezca en casa lejos de los demás \* hasta que:
  - Han pasado 10 días desde que se hizo la prueba. Esto se debe a que aún puede transmitir el virus a otras personas incluso si no tiene síntomas.
  - Si comienza a sentirse enfermo, debe seguir las instrucciones para las personas con los síntomas anteriores.
- **Dígales a todos sus [contactos cercanos](#) que han estado expuestos:** Deles las instrucciones de cuarentena disponibles en [ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish/](https://ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish/)
- **Siga las instrucciones de aislamiento completas:** [ph.lacounty.gov/covidisolationSpanish/](https://ph.lacounty.gov/covidisolationSpanish/)
- **Responda la llamada de LA Public Health:** ayude a reducir la propagación del COVID-19 respondiendo si recibe una llamada de "LA Public Health" o (833) 641-0305. También puede llamar al (833) 540-0473.

**Nota:** Si su prueba fue una prueba de detección (no tiene síntomas, no es un [contacto cercano](#) y no es parte de un brote), existe la posibilidad de que esto pueda ser un resultado falso positivo. TODAVÍA DEBE aislarse a menos que su médico realice pruebas de seguimiento que demuestren que no está infectado.

\* Si ha tenido el COVID-19 en los últimos 90 días y no tiene síntomas de COVID-19, no se recomienda la prueba. Si se hace una prueba dentro de esos 90 días, el resultado podría ser un falso positivo. Esto se debe a que la prueba puede detectar rastros del virus de COVID-19 después de que ya no sea infeccioso. Hable con su médico para ver si tiene el COVID-19 nuevamente.

## Su prueba de COVID-19 fue NEGATIVA

Un resultado negativo de COVID-19 significa que la prueba NO detectó el virus de COVID-19 en el momento en que se hizo la prueba. Probablemente no tenga el virus.

### Si tiene síntomas de COVID-19

Es posible que la prueba sea incorrecta y que usted esté infectado. Esto puede suceder si la prueba se hizo demasiado pronto o si la prueba no detecta la infección.

- **Si tiene síntomas Y tiene una prueba NAAT negativa,** quédese en casa hasta que:
  - You have been fever-free without the help of fever-reducing medicines for at least 24 hours **and**
  - Ha estado libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas **y**
  - Sus otros síntomas han mejorado (a menos que su médico le haya dicho que se quede en casa más tiempo).
- **Si tiene síntomas Y tiene una prueba de antígeno negativa,** debe hacerse una prueba de PCR. Quédese en casa y actúe como si tuviera el COVID-19 hasta que obtenga los resultados de su prueba de PCR. Esto se debe a que las pruebas de antígeno frecuentemente no detectan las infecciones. Consulte la [información para pacientes con síntomas que tienen una prueba de antígeno negativa](#).

## COVID-19 Pruebas

Si no está seguro de qué tipo de prueba se hizo, consulte el informe de resultados de la prueba, consulte con su médico o busque en la página web donde reservó la cita.

Si continúa sintiéndose enfermo, manténgase alejado de los demás y llame a su médico para volver a hacerse la prueba.

### ***Si no tiene síntomas Y ES UN CONTACTO PRÓXIMO de una persona con COVID-19***

- Es posible que aún esté infectado, pero es demasiado pronto para que aparezca en la prueba.
- Debe permanecer en cuarentena \* durante 10 días después de la última vez que tuvo contacto cercano con la persona, incluso si se siente bien. Es importante monitorear su salud para estar atento a los [síntomas de COVID-19](#) durante 14 días desde su último contacto con la persona infectada. Siga las instrucciones completas de cuarentena en [ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish](http://ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish).

\* Las personas completamente vacunadas y aquellas que se han recuperado del COVID-19 confirmado por laboratorio en los últimos 3 meses (90 días) no necesitan ponerse en cuarentena siempre que no presenten ningún síntoma. Consulte [ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish](http://ph.lacounty.gov/covidquarantineSpanish) para obtener más información.

### ***Si no tiene síntomas Y NO ES UN CONTACTO CERCA de una persona con COVID-19 (lo que significa que se trataba de una prueba de detección):***

Es muy poco probable que tenga el COVID-19.

- [Practique la prevención diaria](#), lo que incluye mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, usar una máscara correctamente sobre la nariz y la boca y lavarse las manos con frecuencia. Elija sabiamente y evite las multitudes y los espacios interiores con poco flujo de aire.

## PRUEBAS DE INFECCIÓN PASADA: PRUEBAS DE ANTICUERPOS (serología)

Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 (también conocidas como pruebas serológicas) son análisis de sangre que se usan para buscar anticuerpos contra el SARS-COV-2 (el virus que causa el COVID-19). Si nos enfermamos con el COVID-19 o recibimos la vacuna contra el COVID-19, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo responde. Produce anticuerpos y prepara a nuestras células inmunitarias para que estén listas para combatir el virus en el futuro.

Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 no buscan el virus SARS-CoV-2 real en sí. Se pueden usar para ayudar a decidir si alguien se infectó con el COVID-19 en el pasado. Después de infectarse, el cuerpo tarda entre una y tres semanas en producir suficientes anticuerpos para detectarlos mediante una prueba. Algunas personas pueden tardar incluso más, y algunas personas que se infectaron con el COVID-19 tal vez nunca desarrollen anticuerpos. NINGUNA de las pruebas autorizadas actualmente se [recomienda](#) para ver si las personas han sido vacunadas con éxito contra el COVID-19.

### *Cuando las pruebas de anticuerpos de COVID-19 pueden ser útiles*

Hay situaciones en las que las pruebas de anticuerpos pueden resultar útiles. Por ejemplo:

- Los médicos pueden solicitar pruebas de anticuerpos (además de las pruebas virales) para pacientes con una enfermedad complicada que es difícil de diagnosticar.
- Las organizaciones de salud pública pueden usar pruebas de anticuerpos para obtener más información sobre cómo se ha propagado el virus en una comunidad.
- Los científicos pueden usar pruebas de anticuerpos para la investigación.

*Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 no pueden decirle a una persona:*

- Cuando o si definitivamente tenían el COVID-19
- Si están protegidos (inmunes) o no de COVID-19
- Si es seguro viajar o pasar tiempo con otras personas
- Si necesitan aislarlos o ponerlos en cuarentena
- Si deben o no vacunarse
- Si su vacuna está funcionando o no

Todavía no sabemos si tener anticuerpos contra el virus de COVID-19 puede proteger a alguien de infectarse nuevamente o, si lo hace, cuánto tiempo podría durar esa protección (inmunidad). Incluso si tuvo una prueba de anticuerpos positiva, debe continuar [practicando la prevención diaria](#) para protegerse y proteger a los demás. La vacuna es la mejor manera de protegerse del COVID-19.

Las pruebas de anticuerpos no son 100% precisas, por lo que pueden producirse falsos positivos y negativos. Hable con su médico antes de que le hagan una prueba de anticuerpos. Su médico puede ayudarlo a decidir si debe hacerse la prueba y, si lo hacen, le dirá qué significan sus resultados. Para obtener más información sobre el uso de pruebas de anticuerpos para buscar infecciones pasadas, visite la página [web de los CDC](#).

### MÁS INFORMACIÓN

- **CDC Pruebas de COVID-19:** [página web](#) con enlaces a páginas sobre tipos de pruebas y preguntas frecuentes
- **Conceptos básicos sobre el coronavirus de la FDA:** la [página web](#) explica los diferentes tipos de pruebas y cómo se hacen y aprueban.